

Diarree bij de hond



OORZAKEN DIARREE:

Diarree kan optreden door veel verschillende oorzaken. Iets verkeerd eten, een worminfectie, voerveranderingen en zelfs nervositeit kunnen diarree veroorzaken. Ook wordt diarree, acuut of langdurig gezien bij een aantal algemene ziekten, zoals bijvoorbeeld bij leveraandoeningen. Het is niet altijd even gemakkelijk om te achterhalen wat de oorzaak van de diarree is. Bij acute diarree, dat is diarree die 1 of enkele dagen bestaat, is het ook niet altijd noodzakelijk en zinvol om de oorzaak te achterhalen. Bij chronische of recidiverende diarree is dat wel zinvol.

Afhankelijk van het ziektebeeld is het bij diarree wel of niet nodig met de hond naar de dierenarts te gaan. De ernst van het ziektebeeld wisselt met de oorzaak en vooral met het risico op uitdroging. Bij jongere dieren en als de diarree samen gaat met braken is de kans op uitdroging groter.

VOEDING:

Als de hond levendig blijft en niet braakt, is het verantwoord om het enkele dagen aan te zien. De volgende dieetmaatregelen bespoedigen het herstel.

Licht verteerbare voeding, waarvoor de darmen niet al teveel moeite hoeven te doen om het te verteren en waarvan de voedingsstoffen optimaal gebruikt kunnen worden. Zo blijven weinig reststoffen achter die een voedingsbron voor bacteriën in de dikke darm kunnen vormen.

Frequente kleine maaltijden, zodat de darmen niet overmatig worden belast.

Voldoende vocht, om al het verlies van water aan te vullen. Bij diarree die veroorzaakt wordt door een voedselovergevoeligheid, is het zaak het desbetreffende voedingsbestanddeel waarvoor de overgevoeligheid bestaat uit de voeding te weren.

Eukanuba Intestinal Formula en Hill's Canine I/D zijn geschikte dieetvoerders bij diarree. Het zijn licht verteerbare dieetvoerders, bestaande uit ingrediënten van hoge kwaliteit. Zij vormen slechts een geringe belasting voor het maagdarmkanaal. Beide dieetvoerders zijn samengesteld uit ingrediënten waarvan bekend is dat ze over het algemeen goed verdragen worden.

NAAR DE DIERENARTS:

Als de diarree langer dan drie dagen aanhoudt is het beter even met de hond naar de dierenarts te gaan. Als er naar het oordeel van de dierenarts geen sprake is van een ernstiger oorzaak, is een eenvoudig stopmiddel gecombineerd met een dieetvoer en zonodig een wormkuur meestal voldoende om de hond te helpen.

Anders wordt het als diarree samen gaat met braken. Door teveel braken en vooral als ook vocht wordt uitgebraakt kan uitdroging ontstaan.

Als een hond zich ook ziek gedraagt, niet wil eten en drinken, mogelijk koorts heeft of als er bloed bij de ontlasting wordt gezien is behandeling door de dierenarts nodig.

Medicijnen tegen het braken kunnen dan het beste ingespoten worden. Een brakende hond zal ingegeven tabletjes moeilijk binnen kunnen houden.

Om de hoeveelheid vocht op peil te houden hebben we een speciaal elektrolytenpoeder dat in het drinkwater wordt opgelost. Dit vult de teveel verloren stoffen aan en wordt meestal zo snel opgenomen, dat het niet weer wordt uitgebraakt. Drinkwater moet in kleine hoeveelheden gegeven worden, omdat de kans op uitbraken van het water groter is als er in een keer teveel gedronken wordt.

Als er al sprake is van uitdroging is het een enkele keer nodig de hond extra vocht in de vorm van een infuus te geven. Opname in de kliniek kan dan voor een paar dagen noodzakelijk zijn.

Bij braken en diarree geven wij slechts bij uitzondering antibiotica. In de darm hoort een flink aantal bacteriën van nature thuis en die kunnen door een antibioticum nadelig beïnvloed worden.

