


Konijnenziekte



KONIJNENZIEKTEN IN NEDERLAND:

In Nederland worden bij konijnen twee belangrijke virusziekten veelvuldig gezien. Tegen deze ziekten zijn vaccins beschikbaar. Het betreft Myxomatose en het Viraal Haemorrhagisch Syndroom (= V.H.S.).

MYXOMATOSE:

Myxomatose is een besmettelijke ziekte die overgebracht wordt door muggen en die vooral onder wilde konijnen veelvuldig voorkomt. Doordat de mug die de ziekte overbrengt alleen op zandgronden leeft is myxomatose vooral een probleem op zandgronden en niet op kleigronden. Vaccinatie tegen myxomatose geeft gedurende 6 maanden bescherming.

Om voldoende bescherming te verkrijgen is het noodzakelijk 2x per jaar te vaccineren.

V.H.S. / R.H.D.:

Wordt in Nederland veelvuldig gezien. De enige symptomen zijn acute sterfte, meestal worden er verder geen symptomen waargenomen. De ziekte wordt overgebracht door contact met besmette dieren, door besmet voer zoals gras of kruiden uit weiden met besmette konijnen. Besmetting kan tevens plaatsvinden via waterflesjes, voerbakjes, mensen en insecten.

Enten geeft gedurende 6 maanden voldoende bescherming.

ENTADVIES:

2x per jaar: enting Cunical® (V.H.S.) en Lyomyovax® (Myxomatose).

VOEDING VAN HET KONIJN:

- Onbeperkt hooi
- Brokjes max. 30 gram/kg/dag (± 1 eetlepel per kg). Het liefst pallets geven i.v.m. selectie

VOEDINGSBESTANDDELEN DIE NIET GEGEVEN MOGEN WORDEN:

(zij kunnen ernstige verstoringen van het maagdarmkanaal veroorzaken)

- gemengde granen
- peulvruchten
- kool
- sla
- komkommer
- tomaat
- klaver
- zacht fruit

VOEDINGSBESTANDDELEN DIE WEL GEGEVEN MOGEN WORDEN:

- boerenkool
- bloemkoolblad
- bietenloof
- wortel + loof
- lof van andijvie
- paardebloem
- weegbree
- appels
- beuken en wilgentakken
- broccoli

Bij al deze voedersoorten geldt, dat er geen plotselinge, grote dieetwijzigingen mogen ontstaan. Laat de konijnen telkens langzaam wennen, met kleine porties van het voer.

Konijnenziekte

STERILISATIE / CASTRATIE:

Een alom bekende reden om uw konijn te castreren of te steriliseren is uiteraard het voorkomen van dekkingen en daarmee ongewenste nakomelingen.

Daarnaast zijn er diverse medische indicaties voor met name de sterilisatie:

- o Het voorkomen van baarmoedertumoren op oudere leeftijd
- o Vermindering van ongewenst gedrag.

Sterilisatie kan uitgevoerd worden vanaf 6-7 maanden leeftijd en is bij het konijn een goed uit te voeren operatie.

Het konijn wordt opgenomen en aan het einde van dezelfde dag kan het weer naar huis. Zoals bij iedere ingreep is er bij castratie en sterilisatie een anaesthesie-risico.

BODEMBEDEKKING IN HET KONIJNENHOK:

De bodembedekking van uw konijnenhok speelt een hele belangrijke rol voor de gezondheid van uw konijn. Bij een verkeerde ondergrond kan uw konijn allerlei problemen krijgen. Die problemen variëren van ontstoken hakken en zoolkussens tot verschillende inwendige ziekten aan onder andere lever en luchtwegen.

Uit recente onderzoeken is duidelijk geworden dat zaagsel van met name naaldbomen (sparren en dennen) erg schadelijk kan zijn voor het konijn.

Een meer geschikte ondergrond voor konijnen kan bestaan uit:

- o Kattenbakkorrels
- o Papiersnippers of krantenpapier
- o Katoenprodukten
- o Gemalen maiskernen
- o Zaagsel van andere houtsoorten (bijvoorbeeld populieren)
- o Geperste pallets van houtvezel of geperst papier

