


Maagdarmwormen bij schapen



BELANGRIJK:

Een wormbesmetting geeft niet altijd diarree.

Diarree kan ook veroorzaakt worden door virussen, bacteriën, voedingsproblemen, coccidiose of door een zwaar bemest weiland

Mestonderzoek is essentieel om de veroorzaker van diarree op te sporen (advies: rectaal mengmonster van bij voorkeur minimaal 5 dieren)

BEHANDELING:

- Ontworm correct: alleen als het nodig is, weeg de dieren, controleer spuit / drench-apparaat, controleer de dosering
- Behandel de oaien 3 dagen voordat ze met de lammeren naar buiten gaan
- Behandel de lammeren bij het spenen. Verweid de lammeren naar een schone wei, maar doe dit niet direct
- Behandel bij voorkeur 95 tot 98% van alle dieren
- Laat eenmaal per jaar bepalen of het toegepaste wormmiddel nog effectief. Laat twee weken na de behandeling van de schapen één of meerdere mengmonsters mest onderzoeken.

ADVIES MIDDELEN:

- Cydectin: in bek n.b.: nawerking van een aantal weken tegen Haemonchus contortus en Trichostrongylus
- Noramectin drench: in bek
- Oramec: in bek
- Iverveto: injectie
- Ivomec: injectie
- Dectomax: injectie
- Endex: in bek n.b.: ook werkzaam tegen leverbot
- Panacur: tablet in bek n.b.: bij voorkeur niet gebruiken, veel resistentie tegen dit middel

PREVENTIE:

- Stel een ontwormplan op: behandelingen noteren!
- Beweidingschema: door juiste beweiding wormbesmetting voorkomen/verkleinen! (een goed beweidingschema kan het aantal malen ontwormen tot een minimum beperken)
- * Breng de oaien met lammeren naar buiten op zo schoon mogelijk weiland en verweid ze daarna naar schoon of veilig land:
 - verweiden: tot 1 juli binnen 3 weken, na 1 juli binnen 2 weken
 - schoon: nieuw ingezaaid grasland, gemaaid grasland of land wat dat jaar niet beweid is door schapen
 - veilig: lammeren niet terug laten komen op land binnen drie maanden.
- * ideale situatie: maak 7 percelen
- * hobbyhouder: indien ideale situatie niet haalbaar is: maak schuur met verharde uitloop of uitloop van zand (geen gras), laat hier drachtige dieren (en later oaien met de lammeren) minimaal 3 maanden lopen. Direct na het aflammeren ontwormt u de volwassen dieren. Als groep starten met beweiden en dan om de 3 weken omweiden. Mestonderzoek nadat een perceel voor de tweede keer is beweid.
- Zorg voor goede, weerbare lammeren (voldoende biest en melk, goede voeding)

